

· 반드시 첨부문서를 읽은 후 사용(복용)하시고 첨부문서는 약과 함께 보관하십시오.
 · 올바른 사용(복용)법을 모르거나 의문사항이 있는 경우, 의사·약사와 상담하시기 바랍니다.

일반의약품



WHAL MYUNG SU - U Solutions

[원료약품 및 분량] 1포 중

유효성분: 옥계(KP)	195 mg
정향(KP)	12 mg
건강(KP)	12 mg
옥두구(KP)	6 mg
창출(KP)	33 mg
진피(KP)	1.25 g
후박(KP)	250 mg
아선약(KP)	100 mg
고추틴크(KP)	0.08 ml

첨가제(보존제): 벤조산나트륨 6 mg
 기타첨가제: 멘톨향 31585, 시트르산나트륨수화물, 시트르산수화물, 에탄올, 정제수, 천연레몬라임향 118229, 천연사과향 B11-9791, 카라멜, 프락토올리고당, 프로필렌글리콜, 효소처리스테비아

[성상] 갈색의 액제

[효능효과]

소화불량, 과식, 체한, 위부팽만감, 구역, 구토, 식욕감퇴(식욕부진)

[용법용량]

다음 용량을 1일 3회 식후 복용한다. 복용 간격은 4시간 이상으로 한다.
 - 만 15세이상: 1회 10mL (1포)

[사용상의 주의사항]

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
 - 만 3개월 미만의 젖먹이에게 투여하지 않는다. 또 만 3개월 이상이라도 만 1세 미만의 젖먹이는 의사의 진료를 받는 것을 우선으로 하며, 부득이한 경우를 제외하고 복용시키지 않는 것이 바람직하다.
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
 - 다른 약물을 복용하고 있는 사람
 - 이 약은 카라멜을 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.
- 다음과 같은 사람(경우) 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 이 첨부 문서를 소지할 것.
 - 2주 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우
- 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항
 - 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
 - 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도 감독하에 투여할 것.
- 저장상의 주의사항
 - 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
 - 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것.
 - 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

[저장방법] 실온(1 ~ 30 °C) 보관, 기밀용기

[포장단위] 활명수-유액 10 mL/포 X 5

→ 뒷면계속

[문의전화] 본사 : (02)2021-9300, 소비자 상담실 : 080-023-1897(수신자 요금부담)

[제조외리지] 동화약품(주), 충청북도 충주시 충주산단1로 167

[제조지] 동화약품(주), 충청북도 충주시 충주산단1로 167.

(유)한중제약, 전라북도 완주군 봉동읍 완주산단6로 301 1층, 3층, 5층, 봉동로 705.

본 의약품에 대한 자세한 허가사항은 동화약품(주)홈페이지(www.dong-wha.co.kr)를 참조해주시기 바랍니다.

2007

본 의약품은 KGMP 품질관리를 필한 제품입니다. 구입 시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패, 오염 또는 손상된 제품이 발견될 경우 공정거래위원회고시 소비자분쟁해결기준에 의거, 구입처를 통하여 교환 또는 환불 받을 수 있습니다.

·생약 제제로 간혹 침전의 우려가 있으나 약효는 변화가 없음.

※ 반드시 상기 문서를 읽은 후 복용하며 의문 사항이 있는 경우 의사, 약사와 상담할 것.

※ 부작용 보고 및 피해구제 신청: 한국의약품안전관리원(1644-6223)

※ 이 첨부문서 작성일자(2020년 7월 1일) 이후 변경된 내용은 www.dong-wha.co.kr 또는 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(<http://nedrug.mfds.go.kr>)에서 확인하실 수 있습니다.



동화약품

SINCE 1897